

HEMOFILIE



Logboek



AHVH

U kan een exemplaar bekomen door te
schrijven of te telefoneren naar
het secretariaat van de
Vereniging van Hemofilie- en
von Willebrand patiënten,
uw behandelingscentrum
of bloedtransfusiecentrum.



Briefwisseling:

VZW AHVH

Grisarstraat 38

1070 Brussel

Tel. +32 2 346 02 61

Fax: +32 70 42 44 21

info@ahvh.be

<http://www.ahvh.be>

Een uitgave van de AHVH.

Edition francophone

disponible sur demande.

Dit logboekje werd gerealiseerd dankzij de steun van de
Centrale Afdeling voor Fractionering van het Rode Kruis cvba



CAF-DCF

A HUMAN TO HUMAN APPROACH

www.caf-dcf-redcross.be



Naam:

Voornaam:

Geboortedatum:

Adres:

.....

Telefoon:

Behandelingscentrum:

Adres:

.....

Centrale Telefoon:

Telefoon van de Dienst:

Geneesheerspecialist:

Dossiernummer:

Behandelend Geneesheer:

Telefoon:



MEDISCHE GEGEVENS

Hemofilietype:

Factordeficiëntiegraad in %:

Toegediende stollingsfactor:

Recuperatiegraad:

Vaccinatie:

Hepatitis A; datum:

Hepatitis B; datum:

Andere:

Voorbeeld van de toegediende (aanbevolen) typebehandeling:

Dosis voor de profylactische behandeling:

Dosis voor een spierbloeding:

Dosis voor een gewrichtsbloeding:

Commentaar:

.....

.....

.....



In geval van een ongeval of een trauma dient het tekort aan factor VIII of IX snel aangepast te worden.

Indien mogelijk, moet de substitutiebehandeling voor eventuele aanvullende onderzoeken (radiologische, echografische, ... resultaten) toegediend worden.

BEPAALED HANDELINGEN OF GEDRAGINGEN ZIJN TE VERMIJDEN:

Geneesmiddelen: het gebruik van aspirine en niet-steroidale ontstekingsremmers dient, indien mogelijk, vermeden te worden.

Invasieve behandelingen: puncties, biopsies, ... of andere ingrepen die mogelijks bloedingen kunnen veroorzaken, mogen niet uitgevoerd worden zonder het tekort aan factor VIII of IX te corrigeren.

Een circulair gipsverband: het plaatsen van een gipsverband vraagt een aandachtige opvolging zodat een onverwacht hematoom en druksyndroom tijdig opgespoord kunnen worden.

Intramusculaire injecties: zij dienen vermeden te worden, in het bijzonder in de bil aangezien er het risico bestaat dat een onverwacht hematoom de zenuwen kan knellen.



C.A.F.+D.C.F.+

A HUMAN TO HUMAN APPROACH



HET MATERIAAL

Elke Factorverpakking bevat:

- een flesje met geneesmiddel in poedervorm (gelyofiliseerd);
- een flesje met oplosmiddel;
- een dubbele naald of een specifiek systeem voor het overbrengen van het oplosmiddel in het geneesmiddel;
- een filternaald om het hersamengesteld geneesmiddel in de injectiespuit te zuigen.

Materiaal nodig bij de voorbereiding:

- een injectiespuit;
- een vlindernaald;
- een knelverband;
- antiseptische tampons;
- verband of hechtpleister;
- een speciale afvalcontainer voor het materiaal;
- uw logboek.

De werkruimte:

- een proper werkvlak kiezen in een rustige omgeving;
- het oppervlak reinigen met een ontsmettend middel;
- de handen wassen in lauw water en met zeep, goed afdrogen met een propere handdoek;
- een propere handdoek spreiden over het werkvlak;
- al het materiaal klaarleggen;
- de vervaldatum van het product nakijken;
- de te injecteren dosis berekenen.



De injectie moet langzaam gebeuren, ongeveer 2 ml/minuut, ze mag niet pijnlijk zijn, de huid mag niet opzwellen tijdens de injectie.

Nadat de naald verwijderd werd, stevig op de punctieplaats drukken met een steriel verband gedurende minstens 3 minuten.

Vervolledig uw hemofilieboekje en kleef er de traceerbaarheidlabels in die voorkomen op het flesje.

BELANGRIJK: VOLG DE JUISTE BEREIDING VAN HET PRODUCT

- 1** Verwijder de beschermcapsules van beide flesjes om de stoppen vrij te maken.
- 2** Elke stop ontsmetten met een antiseptisch tampon of met een alcoholdoordrenkt gaas.
- 3** De naald nemen of het transfersysteem, de dop verwijderen van het kortste uiteinde en de naald inbrengen in het midden van de dop van het flesje met oplosmiddel.
- 4** De dop verwijderen van het andere uiteinde van de naald of van het transfersysteem. Het flesje met oplosmiddel omdraaien en de naald inbrengen in het midden van de dop van het flesje met geneesmiddel.



BEREIDEN VAN HET PRODUCT

- 5 Na het overhevelen van het oplosmiddel in het andere flesje, het flesje van het oplosmiddel wegnemen met de naald of het transfersysteem.
- 6 Het flesje met geneesmiddel zachtjes zwenken tot volledige oplossing van het poeder. Eventueel andere flesjes met te injecteren geneesmiddel klaarmaken zoals hierboven.
- 7 De naald uit haar verpakking verwijderen.
De filternaald nemen en aanbrengen op de spuit.
- 8 Opnieuw de dop van het geneesmiddel ontsmetten met een antiseptisch tampon of met een alcoholdoordrenkt gaas.
- 9 De beschermhuls van de filternaald verwijderen, de naald in het flesje met het samengesteld geneesmiddel inbrengen, de vloeistof zachtjes opzuigen in de spuit. De filternaald uittrekken (in geval van injectie die verschillende flesjes vereist, het geneesmiddel in dezelfde spuit opzuigen met telkens een nieuwe filterspuit: één filterspuit per flesje).
- 10 De luchtballen in de spuit verwijderen en deze terugplaatsen in haar verpakking.



Praktische reisgids

Vraag het Secretariaat van de Vereniging van Hemofilie- en von Willebrand patiënten (AHVH) een uittreksel van de gids uitgebracht door de Wereld Hemofilie Vereniging voor de landen waar u van plan bent naartoe te gaan.

Laat het certificaat in bijlage tekenen door uw arts om problemen aan de douane te vermijden. Indien u ter plaatse een arts dient te raadplegen, is het aanbevolen dit certificaat bij de hand te hebben.

**VERGEET NIET UW LOGBOEK EN
UW HEMOFILIEKAART MEE TE NEMEN.**

Uw privé-apotheek bevat minimum volgende zaken:

- Een voldoende reserve aan stollingsproducten met bijhorende toedieningsset.
- Enkele tabletten paracetamol.
- Een armknevel en twee windels.
- Een flesje alcohol en enkele propjes watten.

-
-
-

**To customs port of entry, or
to whom it may concern.**

Date: / /

Dear Sirs,

Mr. born ... / ... / ... is known to me as haemophiliac patient, with factor deficiency.

A haemophiliac can control bleeding with a transfusion of antihæmophilic factor. It would not be possible for him to travel without a supply of plasma concentrates. He carries with him sufficient units for self administration as maintenance therapy and additional amounts in the event of an emergency.

The clotting factor concentrates can be taken in hand luggage only. This is without exception for all circumstances.

Furthermore, it is not allowed to transfer this equipment to hold baggage.

A customs official who inadvertently withholds the bottles of antihæmophilic factor concentrates may place life in jeopardy. For purposes of comparison, it is as if insulin vials were withheld from a diabetic.

If internal or external bleeding occurs, the patient responds well to early self-infused transfusions of antihæmophilic factor concentrates.

His judgment as to when antihæmophilic factor concentrates should be used and as to the quantity, may be relied upon.

In anticipation of your cooperation I remain, yours very truly.

Stamp:

Signature:

MEMO



DATUM
EN UUR

REDEN *

LOCATIE

ETIKETTEN VAN DE GEBRUIKTE PRODUCTEN

3

Knie R

Factane 100 I.E./ml
LOT 214-05F10L
Ex 12/2007
FACTANE 1060 I.E

CAF-DCF

Factane 100 I.E./ml
LOT 214-05F10L
Ex 12/2007
FACTANE 1060 I.E

CAF-DCF

Factane 100 I.E./ml
LOT 214-05F10L
Ex 12/2007
FACTANE 1060 I.E

CAF-DCF

*** Reden inspuiting**

- 1. Spontane bloeding
- 2. Traumatische bloeding
- 3. Supplementaire perfusie voor eenzelfde bloeding

- 4. Chirurgie
- 5. Preventie van de bloedingen
- 6. Immuuntolerantie
- 7. Andere (recuperatiecontrole)

Behandelingen beschreven op deze pagina

(in te vullen door de arts)

..... Aantal dagen perfusies factor VIII of IX

..... Aantal eenheden factor VIII of IX

**DATUM
EN UUR**

REDEN *

LOCATIE

ETIKETTEN VAN DE GEBRUIKTE PRODUCTEN

DATUM EN UUR	REDEN *	LOCATIE	ETIKETTEN VAN DE GEBRUIKTE PRODUCTEN

*** Reden inspuiting**

- 1. Spontane bloeding
- 2. Traumatische bloeding
- 3. Supplementaire perfusie voor eenzelfde bloeding

- 4. Chirurgie
- 5. Preventie van de bloedingen
- 6. Immuuntolerantie
- 7. Andere (recuperatiecontrole)

Behandelingen beschreven op deze pagina

(in te vullen door de arts)

..... Aantal dagen perfusies factor VIII of IX

..... Aantal eenheden factor VIII of IX



Dit logboekje werd
gerealiseerd dankzij
de steun van de
Centrale Afdeling
voor Fractionering
van het Rode Kruis cvba

